



DLP 17-6-86069953

Avertissements[®] agricoles

Abonnement

annuel :

à l'ordre

Régisseur de Recettes

D.D.A. du Nord

SERVICE REGIONAL DE PICARDIE (Somme et Oise)

Cité Administrative - 56, rue Jules-Barni - 80040 AMIENS - Tél. 22.92.51.27

Cité Administrative - 02016 LAON - Tél. 23.23.00.41 (Aisne)

Impression Station d'Avertissements Agricoles - B.P. 29 - 62217 BEAURAINS - Tél. 21.58.70.00

LABORATOIRE REGIONAL D'ANALYSES PHYTOSANITAIRES

Z.A.L. - Rue Roger-Salengro - 62750 LOOS-EN-GOHELLE - Tél. 21.28.27.27



Le 9 mai 1986

spécial grandes cultures

BULLETIN TECHNIQUE N° 7

- . COLZA : méligèthes : surveiller jusqu'au stade E.
Cylindrosporiose - Sclérotinia.
Attention au mélange insecticide-fongicide.
- . CEREALES : maladies du pied et du feuillage.
- . POIS - FEVEROLE: sitones : à surveiller jusqu'au stade 10 cm.
Désherbage post-levée du pois.

colza

STADE : boutons séparés à début floraison pour jet neuf.
Floraison en cours pour bienvenu.

MELIGETHES :

P1 - Premières fleurs ouvertes.



Situation : captures en tous secteurs de la Picardie mais le seuil d'intervention a été ou est maintenant atteint **uniquement** dans les parcelles abritées et situées à proximité d'un ancien champs de colza.

Préconisations : pour les colzas n'ayant pas atteint le stade floraison **SURVEILLEZ** les méligèthes et **INTERVENEZ** si vous observez **2 à 3 méligèthes par inflorescence au stade boutons séparés.**

Après le stade floraison les traitements sont inutiles.

Nouvelle autorisation provisoire de vente sur méligèthes :

- BAYTHROID à 0,2 l/ha.

CYLINDROSPORIOSE :

Situation : souvent observée sur jet neuf mais les attaques sont très faibles.

Préconisations : **INTERVENEZ** si vous observez la maladie et tenez compte du risque sclérotinia dans le choix de votre fongicide.

SCLEROTINIA :

1er cas : parcelles à risque sclérotinia = parcelles ayant porté du colza ou des protéagineux depuis moins de 12 ans.

Préconisations : **le traitement est à réaliser dès la chute des premiers pétales** en visant uniquement le sclérotinia ou le sclérotinia et la cylindrosporiose en cas de présence des 2 maladies.

7/14

G1 - Chute des premiers pétales. Les dix premières siliques ont une longueur inférieure à 2 cm.



2ème cas : parcelles sans risque de sclérotinia.

Préconisations : **N'INTERVENEZ qu'en présence de cylindrosporiose**
Nouvelles autorisations provisoires de vente sur sclérotinia :

- CALIDAN : 3l/ha PELTAR : 3 kg/ha.

ATTENTION AU MELANGE INSECTICIDE-FONGICIDE

Mélange Sportak PF - Insecticides au début floraison.

Le mélange Insecticide Fongicide, attractif sur le plan économie de passage, n'est pas obligatoirement justifié du point de vue technique.

La durée d'action des Pyréthrinoides n'est que de 3 jours sur colza en fleurs. On a donc intérêt à positionner le traitement le plus près possible de l'activité maximum des charançons des siliques.

L'expérience prouve que cette date optimale est souvent déphasée par rapport au traitement des maladies, notamment celles visant le sclérotinia (5 à 10 jours après le début floraison). En conséquence, pour obtenir une valorisation optimale du traitement fongicide, comme du traitement insecticide, il y a donc avantage à faire deux applications.

Toutefois, dans le cas où le mélange est envisagé par l'agriculteur, il est recommandé de ne pas utiliser le Sportak PF.

Enfin, dans la mesure du possible, les traitements insecticides doivent être appliqués en dehors des heures de butinage, de préférence le soir.

blé

STADE : 1 noeud pour les plus avancés.

PIETIN VERSE :

- Situation : . Somme et Aisne : la maladie est souvent superficielle sauf dans les blés sur blés où le seuil est parfois atteint.
 . Oise : seuil d'intervention atteint dans 80 % des blés sur blés (avec ou sans labour) et sur d'autres précédents pour les blés denses de la première quinzaine d'octobre.
 Attaques souvent très faibles pour les autres situations.


SEPTORIOSE : souvent observée sur feuilles du bas.

Préconisations : **ENVISAGEZ un traitement dès le stade 1 noeud si le seuil piétin est atteint (cf bulletin n° 4). Il est INUTILE d'intervenir dans l'immédiat dans les autres situations.**

orges d'hiver et escourgeons

STADE : 1 à 2 noeuds pour les plus avancés.

HELMINTHOSPORIOSE : visible sur F 3 dans 50 % des parcelles dans la Somme et 80 % des parcelles dans l'Oise.



RHYNCHOSPORIOSE : visible sur F 3 dans 50 % des parcelles dans la Somme et 25 % des parcelles dans l'Oise.

vieilles taches avec nécrose centrale grisâtre.

OIDIUM : début d'attaque.

Préconisations : **TRAITEZ dès que possible si vous observez l'helminthosporiose ou la rhynchosporiose sur F 3 (3ème feuille à partir du haut).**

